



10 ข้อที่ต้องทราบก่อน สั่งใช้ยาปฏิชีวนะให้ผู้ป่วย

👤 การประเมิน:

- 1 **ชะลอ**การสั่งใช้ยาปฏิชีวนะหากเป็นไปได้¹
- 2 **สั่งตรวจ**เพาะเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อ ก่อนเริ่มใช้ยาปฏิชีวนะหากสามารถทำได้

✅ หลักปฏิบัติที่ควรยึดถือ:

- 3 **เลือกยาปฏิชีวนะและขนาดยาที่เหมาะสม**โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์²
- 4 **ใช้ยาปฏิชีวนะในระยะเวลาสั้นที่สุด**เท่าที่จำเป็น¹⁻³
- 5 **ประเมิน**ความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม่ำเสมอ
- 6 **ปรับเปลี่ยนเป็นยาที่ออกฤทธิ์แคบลง:** สามารถเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะที่มีความจำเพาะต่อเชื้อที่ก่อโรคมักขึ้นได้หรือไม่^{2,4}
- 7 **เปลี่ยน**จากยาฉีดเป็นยารับประทาน^{1,3,4}
- 8 **ตรวจสอบ**แนวทางการรักษาและนโยบายของโรงพยาบาลล่าสุด

🚫 ข้อควรหลีกเลี่ยง:

- 9 หลีกเลี่ยงการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีแนวโน้มว่าเป็นการติดเชื้อไวรัส^{1,5}
- 10 หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์กว้างเกินความจำเป็นในกรณีที่อาการของผู้ป่วยไม่รุนแรง²



เอกสารอ้างอิง

1. Leekha S, Terrell CL, Edson RS. *Mayo Clin Proc* 2011;86:156-167.
2. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Antibiotic stewardship statement for antibiotic guidelines – The recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). 2016. Available at: <https://www.cdc.gov/hicpac/media/pdfs/antibiotic-stewardship-statement-508.pdf>. Accessed October 2017.
3. Barlam TR, et al. *Clin Infect Dis* 2016;62:e51-e77.
4. Schuts EC, et al. *Lancet Infect Dis* 2016;16:847-856.
5. Colgan R, Powers JH. *Am Fam Physician* 2001;64:999-1005.

