



為病患開立抗生素前， 我必須知道的 10 件事

🔍 評估：

- 1 在可能的情況下，**延遲**開立抗生素¹
- 2 開立抗生素前，儘可能**先安排**培養與敏感性試驗¹

✅ 始終遵守：

- 3 基於療效及不良事件風險，**選擇正確的抗生素與劑量**²
- 4 儘可能以**最短療程**進行治療¹⁻³
- 5 不時**重新評估**病患是否有需要使用抗生素
- 6 **降階治療**：是否可以使用更有針對性的抗生素來治療感染？^{2,4}
- 7 在可能的情況下，從靜脈注射治療**轉換**為口服治療^{1,3,4}
- 8 **查閱**最新的治療指引與醫院政策

🚫 避免：

- 9 當病毒感染可能是病因時開立抗生素^{1,5}
- 10 針對較輕微的疾病使用廣效性抗生素²



參考資料：

1. Leekha S, Terrell CL, Edson RS. *Mayo Clin Proc* 2011;86:156-167.
2. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. Antibiotic stewardship statement for antibiotic guidelines – The recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). 2016. Available at: <https://www.cdc.gov/hicpac/media/pdfs/antibiotic-stewardship-statement-508.pdf>. Accessed October 2017.
3. Barlam TR, et al. *Clin Infect Dis* 2016;62:e51-e77.
4. Schuts EC, et al. *Lancet Infect Dis* 2016;16:847-856.
5. Colgan R, Powers JH. *Am Fam Physician* 2001;64:999-1005.

